

رېبس يا د لیوني سپي ناروغي

دهقان (بزگر) اوونیزه

راټول کړی :

ډاکټر حامد نوروز،

د حیواني روغتیا د اخبار وړ حیواني ناروغيو سره د مبارزې مدیر

د رېبس یا لیوني سپي ناروغي درې تر څلور زره کاله مخینه لري. ابو علي سینا، دا ناروغي له اوبو څخه ډار تر عنوان لاندې معرفي کړی دی. د لیوني سپي ناروغي په نړۍ کې تر ټولو پخوانی ناروغي پېژندل شوی دی. په پخواني یونان کې د رېبس ویی «کلمه» د «لزا او یالټا» په نومونو چې د لیونتوب مانا ورکوي کارول شوی دی. د رېبس لاتین ویی د سانسکریټ له پخواني ویی «Rabhas» چې د «تاوتریخوالی» مانا لري اخیستل شوی دی. د لیوني سپي ناروغي یوه ساري ویروسي او زنوز (د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ګډه) ناروغي ده، چې د حاد مغزي التهاب لامل کیږي. دا ناروغي په ټولو ګرم ویني لرونکو حیواناتو له ډلې انسانانو کولای شي، چې ناروغي رامنځته کړي. ویروس ددې ناروغي د اخته حیوان د خولې د لارو د انسان د ډارل شوي ځای له لارې بدن ته ننوځي، په عضلاتو کې د آخري عصابو خواته ځي او تکثیر پیلوي. د مبتلا کېدو په صورت کې مړینه حتمي خبره ده، د تاریخ په اوږدو کې یوازې شپږ کسان له دې ناروغي روغ وتلي دي. په ۲۰۰۴م کال کې د امریکا متحده ایالاتو په ویسکانسین کې د لیوني سپي له ناروغي څخه د یوې ۱۵ کلنې انجلې رغېدل لومړنۍ پېښه ده، چې راپور شوې ده. د حیواني روغتیا نړوال سازمان وايي: «د رېبس ناروغي له امله هر کال تر ۷۰ زره ماشومان مړه کیږي». په هغه راپور کې، چې په ۲۰۱۵م کال کې د «د رېبس پر وړاندې نړواله ټولنه» خپره کړې ده، ښیي چې په نړۍ کې د کال ۵۹ زره کسان د سپیو د ډارلو له امله په دې ناروغي اخته او خپل ژوند له لاسه ورکوي.

خپرېدل «شیوع»

په ۲۰۱۰م کال کې نږدې ۲۶ زره کسانو ددې ناروغي له امله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ۱۹۹۰یم کال کې دا شمېره دوه چنده یعنې ۵۵ زره (۳۱ زره یې په آسیا او ۲۴ زره یې په افریقا) کې وه. په ۲۰۱۵م کال کې اعلان شو چې ددې ناروغي له امله څه باندې ۵۹ زره کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې ډېر شمېر پرمختللي هېوادونه په سپیو کې یاده ناروغي له منځه وړي دي. خو مخ پر ودې هېوادونو کې لاهم دا ناروغي په کورنیو سپیو کې شتون لري. «د رېبس پر وړاندې د نړیوالې ټولنې» راپور وايي، چې دورځې نږدې ۱۶۰ کسان ددې ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې ۶۰ سلنه یې په آسیا او ۳۶ سلنه یې په افریقا کې رامنځته کیږي. د رېبس ناروغي ۳۵ سلنه یوازې په هند کې رامنځته کیږي، چې د نړۍ په کچه له هر هېواد څخه ډېر دی. د نړۍ په کچه په انسانانو کې رېبس ناروغي څه باندې ۹۹ سلنه د سپیو له لارې لېږدول کیږي خو په امریکا کې ډېری موارد یې په انسانانو کې د ښایېرلک یا د خفاشونو له لارې لېږدول کیږي او د سپیو له لارې یوازې پنځه سلنه کسان په دې قاره کې په دې ناروغي اخته کیږي. د رېبس ناروغي د نړۍ په نږدې ۱۵۰ هېوادونو کې شتون لري. د اروپا او استرالیا په ډېرو سیمو کې ددې ناروغي ویرویس یوازې په خفاشونو کې دی. په یوشمېر جزایرو کې دا ناروغي له سره شتون نه لري. نږدې ۴۰ سلنه مړه شوي کسان له ۱۵ کالو کم عمر لرونکي دي، چې د ډارلو له لارې په دې ناروغي اخته شوي دي. اخته شوي ماشومان هغه ماشومان دي، چې له وېرې پرته په دې ویروس د ککړو سپیو ځواني تللي دي. له کومه ځایه چې ډېری ماشومان د سپیو په واسطه له ډارلو وروسته خپل مور او پلار ته د پېښې د وضاحت ورکولو وړتیا نه لري، نړیوال روغتیايي اداره په دې اندېښنه ده، چې د مړینې دقیقه شمېره به له رسمي شمېرو څخه زیات وي.

په سویس کې

د سویس په هېواد کې ډېری کسان د ګډېرو د ډارلو له لارې د لیوني سپي په ناروغي اخته کیږي. خو کارپوهانو په مړه شویو چرګانو کې د رېبس ضد ویروس درمل وکارول او په آلپ غرونو کې یې د خوشي کړل او کله چې ګډېرو دا چرګان وخوړل دا ناروغي له منځه ولاړ.

لامل

ددې ناروغي لامل د آر ان ای لرونکي ویروس، غیر هوازي او نوروتروپ (عصي سیستم ته لېوالتیا لري) د ویروسونو د رابډو له ډلې او د لیزا ویروس له جنس څخه دی. د رېبس ویروس زیګ او لږمقاومت لرونکی دی او په طبیعت کې دوام نه کوي. کله چې په مرکزي عصبي سیستم برید وکړي، تر ډېره د اخته شوي کس د مړینې لامل کیږي. یاد ویروس په ۵۰ درجې تودوخه کې په ۱۵ دقیقو کې او په ۶۰ درجې تودوخه کې په ۳۵ ثانیو او په ۱۰۰ درجې تودوخه کې په څو ثانیو کې له منځه ځي، نو ښه خبره

داده، چې د ددې ویروس د اخته شویو توکو د ضد عفوني کولو په پار باید یاد توکي د څو دقیقو لپاره و خوټل شي او با په فینول او الګولو ومینځل شي.

د ناروغي مخازن

ټول گرم ویني لرونکي وحشي او اهلي حیوانات له دې ناروغي سره حساس دي. په الوتونکو کې یاده ناروغي یوازې په څېړنیزو مرکزونو کې راپور ورکړل شوي دي. الوتونکي، کبان، خزنده ګان او هغه حیوانات چې په وچه او اوبو کې ژوند کې تر ډېره په دې ناروغي نه اخته کېږي.

تر ډېره په وحشي حیواناتو او عمدتاً په ښاپېرکو یا خفاشونو او ګیدرو کې دي. دغه راز په اهلي حیواناتو کې شپږې ورکونکي غواوي د پام وړ اخته کېږي او په آس، وزو، وریو کې لږ تشخیصیږي. دغه راز په کورنیو حیواناتو کې تر ډېره په پشوګانو او سپیو کې دي.

د ناروغي د خپرېدا لارې

انسان ته د ربیس د ناروغي د لېږل تر ټولو مهمه لار په دې ویروس د ککړ حیوان دارل دی، چې د دارلو له لارې انسان ته د ربیس ناروغي لېږدي؛ که په دې ویروس د اخته حیوان د خولې او یا پوزې لارې د پوستکي له تپ او یا د بدن مخاطي عشا سره تماس پیدا کړي یاده ناروغي انسان ته لېږدي. که چېرې کوم حیوان مو وداري په هغه صورت کې ددې ناروغي د اخته کېدو شونتیا شته چې په حیوان کې یاد ویروس موجود وي او ویروس د حیوان عصبي سیستم او د خولې لارو سره یوځی شوی وي، دې ته په کتو هره دارل ددې مانا نه لري، چې یاده ناروغي لېږدوي خو له دارلو وروسته د درملنې او مخنیوي اقدامات اړین دي. (په ربیس اخته حیوان، لږترلږه ۱۰ ورځې ژوندي پاته کېدای شي)

مخنیوی

کوم کسان چې د دندو له امله حیواناتو سره په اړیکه کې دي لکه (دربیس د تشخیص د لابراتوار کارکوونکي، وټرنران، ښکاریان، مالداران، د چاپېریال ساتنې کارکوونکي، د مسلخونو کارکوونکي، کوم کسان چې په امنیتي ځواکونو کې د سپیو ښوونې او روزنې دنده پر غاړه لري، کوم کسان چې د څېړنو لپاره غارونو ته ورځي او په ټولیزه توګه کوم کسان، چې ددې شونتیا شته چې حیوانات یې وداري) باید د ربیس ناروغي پر وړاندې واکسین شي. په یادو خلکو کې د ربیس ناروغي د مخنیوي په پار په دوو پړاوونو کې واکسین پلي کېږي، چې د لومړي پړاو څخه اووه ورځې وروسته بیا پلي کېږي او یاد کسان باید په هرو څلورو کلونو کې یاد واکسین تر لاسه کړي (خو په وینه کې د انټي باډي تر اندازه کولو وروسته) درملنه

کله چې انسان د کوم حیوان په واسطه ودارل شي:

- ۱- باید ژر ژر تپ په اوبو و صابون سره ۱۵-۱۰ دقیقو پورې ومینځل شي. که صابون ته لاس رسي نه وي یوازې په اوبو ومینځل شي. دا چاره د لیوني سپي د ناروغي پر وړاندې د لومړنیو مرستو یو مهم ګام دی.
- ۲- که چېرې تپ رامنځته شوی وي، تپ باید د ۷۰ سلنې الګول اېټانول یا پایوډین-آیوډین سره په بشپړه توګه پاک شي.
- ۳- ناروغ باید ژر تر ژره د درملنې لپاره روغتیايي مرکز ته ولېږل شي.
- هغه فکتورونه چې د لیوني سپي د ناروغي په پرمختګ کې اغېزمن دي:
 - ۱- اخته کېدو ډول
 - ۲- دارلو شدت
 - ۳- د لېږدونکي حیوان ډول
 - ۴- ویروسونو کچه
 - ۵- دالړ شوي سیمې د معافیتي سیستم ځړنګوالی
 - ۶- دارل شوي ځای موقعیت- د سر او غاړې تپونه او په هغو ځایونو کې چې ډېر عصبي رېښې شتون لري په دې صورت کې لږ وخت لرو او لامل یې هم عصبي انساجو ته د ویروس نږدېوالی دی.
- په سپیو کې د لیوني سپي د ناروغي نښې:
- وېره، برېډګر حالت، سخت بلع، گیج کېدل، خوله اچول او د غېرو نارملو شیانو لکه لږګي او نورشیان خوړل، غېر مستقیم او یوې خواته منډې وهل، د غږ بدلون، بد ډول عوعو کول (د غږ ویستلو توان نه لري)
- د خولې په زاویو کې د لارو زیاتوالی
- په انسان کې د لیوني سپي د ناروغي نښې:
- د دارل شوي برخې درد او ښارخت

تیه، کسالت، د سردرد چې له ۴-۲ ورځو دوام کوي

هایډرو فوبیا(له اوبو څخه ډار)

د غږ، رڼا او هوا نه تحمل

غوسه، تخریش او افسرده کي

د فعالیت کموالی

د لیوني سپي ناروغي چې د لیوني سپي د کلاسیک ویروس له لارې رامنځته شي، نږدې سل په سلو کې مرګونی دی او هېڅ درمل نه لري.

بڼه شوي کسان:

د تاریخ په اوږدو کې یوازې شپږ کسان له ربېس څخه ژوندي وتلي دي .

په ۲۰۰۴م کال کې د امریکا متحده ایالاتو په ویسکانسین کې د لیوني سپي له ناورغي څخه د یوې ۱۵ کلنې انجلۍ رېډل لومړنۍ پېښه ده، چې راپور شوې ده. د ۲۰۱۱م کال د جون په ۱۲ مه د کالفورنیا د هومبولت ښار اوسیدونکې اته کلنه انجلۍ په امریکا کې درېیم کس و چې ربېس ویروس پر وړاندې مقاومت وکړي او ژوند پاتې شي. سپی او لېوه: برېډګر حالت او د خولې لارې وتل(په نږدې یوه اوونۍ کې حیوان له منځه ځي)

اوبښ: له حده زیاد کاره واره کېدل

ګېډر-پشو: نوازش ته لېوال تیا لري، ګوتې ډاري

غوا: د غوډلي لرګي او د خپلو خوږو لوبښې ډاري

وزه او وري: خپل سرو په دېوال او یاستون پورې نښلوي او زور وهي،

هغه هېوادونه چې ربېس په کې له منځه تللی دی:

په ډېرو هېوادونو کې ربېس له منځه تللی او یا ددې کار په ترسره کول کې دي. په دې لومړل کې هغه هېوادونه دي، چې په ۲۰۰۹م کال کې د ربېس هېڅ کومه پېښه په کې نده شوې.

- آفریقا: کیپ ورد، لیبیا، موریس، مراسم، سایوتومه و پرنسپ، او سیشل،
- امریکا: برمودا، سنت پیر و میکلون، آنتیګوا و باربودا، آروبا، باهاما، باربادوس، جزایر کیمن، دومینیکا، جزیره ګوادلوپ، جامایکا، مارتینیک، مونتسرات، آنتیل هلند، سنت کیتس (سنت کریستوفر) و نویس، سنت لوسیا، سنت مارتین، سنت وینسنت و ګرنادین، ترکس و کایکوس، او جزایر ویرجین (بریتانیا او متحده ایالات)،
- آسیا و خاورمیانه: هانګ کانګ، جاپان، کویت، لبنان، مالزی، قطر، سنگاپور، عربي متحده امارات او ایران،
- اروپا: اتریش، بلژیک، قبرس، د چک جمهوریت، دنمارک، فنلاند، جبل الطارق، یونان، ایسلند، ایرلند، جزیره من، لوکز امبورګ، هالند، ناروی، پرتغال، اسپانیا (له سیوتا و ملیلیه پرته)، سویډن، سوییس او بریتانیا،
- استرالیا (اقیانوسیه): استرالیا، د کوک جزایر، فیجی، پلینزی، فرانسه، ګوام، هاوایی، کیریباتی، میکرونزی، نوی کالدونیا، نیوزیلند، د ماریانا شمالي جزایر، پالاو، پاپوا ګینه نو، ساموآ، او وانواتو.

روغتیا یې پیغام

کورني او وحشي حیواناتو سره له اړیکو ډډه وکړئ. هڅه وکړئ، چې د حیوان خانګړتیاوې او کرنې وپېژنی او تل مو باید پام وي، چې غیر معمول او حیرانوونکي کرنې ونه کړي.